

Life is all about
strong bonds



ウイルスによる感染症は治療が
難しいので、ワクチンによる予防が
効果的です

ノビバック®TRICATは猫の主要ウイルス感染症である

- 1 猫ウイルス性鼻気管炎 (FVR)
- 2 猫カリシウイルス感染症 (FCVI)
- 3 猫汎白血球減少症 (FPL)

の予防に有効なワクチンです。この3つの感染症を起こす
ウイルスは伝染力が高いため、予防は最も重要です。

初めてワクチン接種をする
オーナー様へ

1回目のワクチン接種では確実な免疫ができないこと
があります。初めてワクチン接種する場合は、3週間隔
で複数回の接種が必要です。また、接種後免疫ができ
るまで約2~3週間は他の猫に近づけないようにして
ください。

感染症の症状

1 猫ウイルス性鼻気管炎 FVR

猫ヘルペスウイルスによる感染症です。発生率が高
く、激しいくしゃみ、咳、鼻炎、発熱などの風邪
のような症状の他、角膜炎や結膜炎を引き起こし
ます。他の呼吸器病との混合感染が多く、細菌の
二次感染により肺炎を併発することもあります。
子猫では症状が激しく、死亡率の高い病気です。
キャリアー（ウイルスに感染している猫）の鼻・口
の粘膜から感染します。

2 猫カリシウイルス感染症 FCVI

猫カリシウイルスによる感染症です。はじめは
くしゃみ、鼻水、発熱など風邪に似た症状がみられ
ますが、症状が進むと舌・口の周囲の水疱、潰瘍
がみられるのが特徴です。また、他の病気との混合
感染により合併症を引き起こし、症状が悪化、死亡
することもあります。キャリアー（ウイルスに感染
している猫）から感染します。



3 猫汎白血球減少症 FPL

猫バルボウイルスによる感染症です。血液中の白血球
が極端に少なくなる感染症で、元気消失、食欲不振、
高熱、嘔吐、下痢による脱水といった症状がみられます。
経過が早く、とくに子猫では死亡率が非常に高い病気です。

