

ニューフロール[®]450注射液

<投与量早見表>

製造販売元: 株式会社インターベット



1日1回、2~3日間、
牛(搾乳牛を除く)の
筋肉内に注射して下さい。
投与後の使用禁止期間は
30日間です。

ご不明な点はかかりつけの獣医さんへ
ご相談ください。

体重 (kg)	投与量 (mL)
45	1
90	2
135	3
180	4
225	5
270	6
315	7
360	8
405	9
450	10

フロコール[®]200注射液

<投与量早見表>

製造販売元: ナガセ医薬品株式会社



1日1回、2~3日間、
牛(搾乳牛を除く)の
筋肉内に注射して下さい。
投与後の使用禁止期間は
30日間です。

ご不明な点はかかりつけの獣医さんへ
ご相談ください。

体重 (kg)	投与量 (mL)
50	2.5
100	5
150	7.5
200	10
250	12.5
300	15

フロコール[®]2%液

<牛・投与量早見表>

製造販売元: 株式会社インターベツト



フロコール[®]2%液を代用乳に混ぜ、
1日1回、牛(2月齢以下)に3~5日間与えてください。

投与後の使用禁止期間は4日間です。

体重 (kg)	フロルフェニコール濃度	
	5mg/kg	10mg/kg
1kgあたり	0.25mL	0.5mL
⋮	⋮	⋮
30	7.5	15
40	10	20
50	12.5	25
60	15	30
70	17.5	35
80	20	40
90	22.5	45
100	25	50

※豚の投与量、投与期間及び使用禁止期間等は、牛のものとは異なります。

ご不明な点はかかりつけの獣医さんへご相談ください。

お問合せ先: **株式会社インターベツト**

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア8F
TEL (03) 6272-0770 FAX (03) 6238-9080



2018年7月作成
JP/FLSO/0518/0001