

甲状腺機能低下症によくある症状



近年、甲状腺機能低下症になる犬が増えています。
その発生率は10年前とくらべると実に**5倍**。
症状が老化現象に似ており、
病気だと気づかないことが多いようです。
まずは、かかりつけの獣医師に診断してもらいましょう。

■多摩臨床研究会(現多摩研式 疾病統計研究会)のデータ



ペットオーナーの皆様へ

甲状腺機能低下症は
完治させることができない病気です。
その為、生涯投薬を続ける必要があります。
定期的な検査を受けましょう。

本薬剤に関するお問い合わせは、当院までご連絡ください。



甲状腺機能低下症に、 1日1回の新習慣。



動物用医薬品
要指示医薬品
劇薬

レベンタ®

世界初! NEW

犬用液状レボチロキシンナトリウム製剤



株式会社インターベット

甲状腺機能低下症に、
1日1回の新習慣。

レベンタ[®]

液状のレベンタだから!

1日1回でOK

日々の投与のわずらわしさから解放します。

投与がカンタン

専用シリンジでフードにかけるだけで投与完了です。

正確に量れる

体重に合わせた正確な投与が可能で安心です。

レベンタの使用方法

1日1回、フードにかけるだけのカンタン投与。

- ▶ レベンタを1日1回、少量(食べきれる量)のフードに混ぜて投与してください。
- ▶ レベンタを混ぜたフードを食べきった事を確認した後残りのフードを与えてください。
- ▶ 獣医師に処方された用量を正確に量り、毎日決まった時間に投与してください。
- ▶ フードへのかけ方など、投与方法を毎回同じようにすることが大切です。

以下の写真を参考にして投与してください。

1



ボトルをしっかりと握り、キャップを下に押し込みながらまわして開く。

2




シリンジのプランジャーを最後まで押し切り、ボトルに装着する。

3



ボトルとシリンジの上下を反転させ、必要量になるまでプランジャーを引く。



正確な用量を量るため、必ず水平の位置から目盛りを読む。

6



清潔な水でシリンジを洗浄し、自然乾燥させる。

5



少量(食べきれる量)のフードに混ぜる。

4



ボトルとシリンジを反転させ、ボトルからシリンジを外す。

