

Nuflor[®]
(FLORFENICOL)



牛用フロルフェニコール高濃度製剤
ニューフロー[®]450 注射液



注意一獣医師の処方せん・指示により使用すること。

The Science of Healthier Animals™

MSDアニマルヘルス株式会社は、動物の健康、福祉、そして生産性の向上に役立つよう力を注いでいます。


 **MSD**
Animal Health

ニューフロール[®]450 注射液は、 高濃度製剤なので投与液量が少なくなりました！





フロルフェニコール 20%製剤 (5 mL/ 牛 100 kg) に対して、
ニューフロール[®]450 注射液 (2.3 mL/ 牛 100 kg) は、投与
液量が少なくなりました。

フロルフェニコール20%製品 ニューフロール450注射液



投与液量	体 重
1 mL	45 kg
2 mL	90 kg
3 mL	135 kg
4 mL	180 kg
5 mL	225 kg
6 mL	270 kg
7 mL	315 kg
8 mL	360 kg
9 mL	405 kg
10 mL	450 kg

ニューフロール[®]450 注射液は、 高濃度製剤ですが粘度は高くありません！




検査機関: 日本食品分析センター




肺炎起因菌に対するフロルフェニコールの 抗菌活性は維持されています！



パストレラ・ムルトシダの薬剤感受性試験
2008~2015年 分離株 (1,656株)



マンヘミア・ヘモリチカの薬剤感受性試験
2008~2015年 分離株 (709株)



出典: MSDアニマルヘルス株式会社 社内資料

ERFX : エンロフロキサシン、**Nuflor®** (FLORFENICOL) : フロルフェニコール
 TP : チアンフェニコール、OTC : オキシテトラサイクリン
 KM : カナマイシン、ABPC : アンピシリン

